



CINNASIN PLUS:

Es un producto formulado del extracto de canela (*cinnamomum zeylanicum*) con alto contenido de aldehído cinámico el cual ejerce una fuerte acción contra ácaros (blanco y rojo) y atacando hongos como la cenicilla.

Su manera de acción es de contacto así que es imprescindible una muy buena cobertura a la planta para poder llegar al insecto u hongo.

BENEFICIOS:

Su uso es para el control de ácaros en los cultivos que se presenten siendo aplicado con muy buena cobertura por ser un producto de contacto actuando como paralizante de los sistemas nervioso, respiratorio y digestivo ocasionado la muerte en los organismos a su vez protegiendo a la planta de ataques de patógenos.

INCOMPATIBILIDAD:

No se debe mezclar con productos altamente alcalinos, sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico aplicado sobre los cultivos indicados y a las dosis señaladas en las recomendaciones de uso.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO:

Este producto no requiere equipo de protección por ser poco tóxico, sin embargo, al utilizar en mezcla con otros productos tóxicos se recomienda seguir las indicaciones para el uso y manejo correcto de los plaguicidas, en este caso:

AL MEZCLAR: Proteger los ojos con gafas y las manos con guantes. Utilizar ropa protectora, evitar el contacto con la aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión y/o inhalación retire a la persona del lugar y recuéstela en un lugar bien ventilado.

Si la persona ingirió el producto, induzca al vomito.

Si hay contacto con la piel, lave con agua corriente y jabón.

Si penetró en los ojos, lave con abundante agua por 10 minutos.



STELLA

BioAgTech

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ANALISIS GARANTIZADO

%(P/V)

INGREDIENTES ACTIVOS:

Extracto de canela
(*Cinnamomum zeylanicum nese*) 30%
Equivalente a 300.57g de i.a./L a 20°C

Aceite de Neem (*Azadirachta indica*) 20%
Equivalente a 200.38g de i.a./L a 20°C

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes y diluyentes 50%

TOTAL 100%

INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS/Ha	OBSERVACIONES
•Berenjena •Chile •Jitomate •Tomate verde •Okra •Papa •Pimiento morrón	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 2.0 L	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, el volumen de aplicación sugerido es 600 litros de agua/ha. Aplicación: Foliar
•Arándano •Grosella •Frambuesa •Fresa •Vid •Kiwi •Zarzamora	Araña Roja (<i>Tetranychus spp</i>) Trips (<i>Thrips sp.</i>)	1.5 - 2.0 L	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, el volumen de aplicación sugerido es 600 litros de agua/ha. Aplicación: Foliar

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONAS TRATADAS:

Puede reentrarse al cultivo una vez que la aspersión se ha secado.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, cuando haya una alta probabilidad de lluvias o cuando la velocidad del viento sea alta.

