



INSECTICIDA ORGÁNICO:

Tiene acción de repelencia y prevención de reinfestaciones, pero con un grado más alto en su efecto de repelencia ya que cuenta con extractos de capsaicina que lo hacen más agresivo, ya sea para evitar las reinfestaciones por migraciones como también el sacarlos de sus refugios por la acción irritante que tiene el producto y a su vez estimula el crecimiento de las plantas e incrementa su vigor.

Promueve el equilibrio ecológico del microambiente atrayendo fauna benéfica: Reduce o elimina el estrés fisiológico causado por fitotoxicidad (uso de agroquímicos) o labores en las plantas tratadas. Es favorable para lograr cultivos libres de plaguicidas, bajo manejo integrado de plagas (MIP) o dentro de la agricultura orgánica.

RECOMENDACIONES:

Por ser soluble y de baja tensión superficial, se puede mezclar con foliares e insecticidas convencionales, sugiriendo el empleo de subdosis recomendadas por el técnico de campo. (acción cinergetizante) Infoquímicos (alomonas) de acción repelente y dispersora de alimentación en organismos perjudiciales.

PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIAS DE USO:

Este producto no requiere equipo de protección por ser poco tóxico, sin embargo, al utilizar en mezcla con otros productos tóxicos se recomienda seguir las indicaciones para el uso y manejo correcto de los plaguicidas, en este caso.

AL MEZCLAR:


Proteger los ojos con gafas y las manos con guantes. Utilizar ropa protectora, evitar el contacto con la aspersion.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco, no se deje al alcance de los niños ni se exponga el producto al contacto de animales y/o alimentos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Maneje el envase vacío y residuos dándole un lavado y no reutilizando el envase.



STELLA

BioAgTech

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ANÁLISIS GARANTIZADO	%(P/V)
INGREDIENTES ACTIVOS:	
Extracto de ajo (<i>Allium Sativum</i>) Equivalente a 501.05g de i.a./L a 20°C	50%
Aceite de Neem (<i>Azadirachta indica</i>) Equivalente a 200.42g de i.a./L a 20°C	20%
Extracto de Chile (<i>Capsicum annum</i>) Equivalente a 100.21g de i.a./L a 20°C	10%
INGREDIENTES INERTES:	
Emulsificantes y diluyentes	20%
TOTAL	100%

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS/Ha	OBSERVACIONES
•Berenjena •Chile •Jitomate •Tomate verde •Papa •Pimiento morrón	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 5.0 L	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, el volumen de aplicación sugerido es 370-373 litros de agua/ha. Aplicación: Foliar
•Arándano •Grosella •Frambuesa •Fresa •Vid •Kiwi •Zarzamora	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1.5 - 5.0 L	Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días. Cuando se detecten los primeros individuos de la plaga, el volumen de aplicación sugerido es 400 Litros de agua/ha. Aplicación: Foliar

DOSIS:

Aplicación foliar de 1.5 a 5.0 lts./Ha de producto en volumen suficiente de agua para lograr una buena cobertura, dependiendo del desarrollo vegetativo y niveles de infestación que se encuentre en el cultivo.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONAS TRATADAS:

Puede reentrarse al cultivo una vez que la aspersion se ha secado.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, cuando haya una alta probabilidad de lluvias o cuando la velocidad del viento sea alta.

